

K-FENOL MIX

Výrobce: **AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice**

Číslo rozhodnutí o registraci:

Chemické a fyzikální vlastnosti	obsah (%)	obsah (g/litr)
4-nitrofenolát draselný	0,99	9,9
2-nitrofenolát draselný	0,66	6,6
5-nitroguajakolát draselný	0,325	3,25

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg pomocné látky): kadmium 1, olova 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50

Působení přípravku

K-FENOL MIX je určen po smísení s vodou k aplikaci na rostliny s cílem zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů. **K-FENOL MIX** působí na vyšší příjem a využití živin rostlinou, což se projevuje dobrým zakořeňováním a intenzivním růstem rostlin. Při aplikaci před kvetením zemědělských plodin ovlivňuje klíčení pylových zrn, má pozitivní vliv na násadu plodů a semen, u pšenice přispívá ke zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrně. U řepky ozimé aplikace před květem a během květu přispívá k vyšší tvorbě šesulí s vyšším obsahem ligninu. Aplikace po působení mrazu, po krupobití nebo po předchozí aplikaci méně selektivních pesticidů přispívá k nastartování příjmu živin z půdy a tím k rychlejšímu překonání stresu a zahájení růstu.

Rozsah a způsob použití

K-FENOL MIX aplikujte postřikem na list v následujících dávkách a termínech:

Plodina	Dávka (koncentrace)	Max. počet aplikací	Termín aplikace a účinnost
Řepka ozimá Řepka jarní Hořčice	0,2 l/ha	3	1. fáze listové růžice 2. před květem až začátkem květu, zvýšení počtu šesulí 3. barva šesulí se mění z tmavě zelené na sv. zelenou, zvýšení výnosu, omezení ztrát
Slunečnice	0,2 l/ha	2	1. fáze 4 – 6 listů 2. začátek květu
Mák	0,2 l/ha	2	1. fáze listové růžice 2. fáze dlouhivého růstu až háčkování
Cukrovka	0,2 l/ha	2	1. ve stádiu 4 – 6 párů pravých listů 2. cukrovka zakrývá meziřádky
Chmel	0,2 l/ha	4	1. fáze intenzivního růstu (2 m výšky) 2. 7 – 10 dní po 1. aplikaci 3. před květem 4. po odkvětu
Brambory	0,2 l/ha	3	1. rostliny zakrývají meziřádky 2. cca 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci

Obilniny	0,2 l/ha	2	1. od počátku odnožování 2. před metáním až na začátku metání, ovlivnění kvality – obsahu N látek v zrna
Vinná réva	0,2 l/ha (0,04%)	4	1. před květem 2. – 4. v intervalu 10 – 14 dní
Kukuřice	0,2 l/ha	2	1. fáze 6 – 10 listů 2. na začátku květu palic
Hrách Sója	0,2 l/ha	2	1. fáze cca 5 – 10 cm 2. před květem
Kmín	0,2 l/ha	2	1. druhý rok – brzy z jara 2. cca 14 dní po první aplikaci
Len	0,2 l/ha	2	1. ve výšce rostlin cca 10 cm 2. na začátku rychlého růstu, zvýšení výnosu dlouhého vlákna
Cibule a česnek	0,2 l/ha (0,04%)	3	1. ve fázi dvou pravých listů (výška 15 cm) 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní po 2. aplikaci
Jádroviny	0,2 l/ha	3	1. před květem 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní 2. aplikaci
Peckoviny	0,3 l/ha	2	1. na začátku květu, při rozkvětu 20% květů 2. na konci květu, asi za 7 – 10 dní po 1. aplikaci
Rajčata	0,2 l/ha (0,04%)	3	1. po výsadbě 2. ve fázi butonizace 3. na začátku kvetení prvního vijanu
Okurky	0,2 l/ha (0,04%)	3	1. ve fázi dvou pravých listů 2. 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci
Paprika	0,2 l/ha (0,04%)	2	1. před květem 2. 14 dní po 1. aplikaci
Jahody	0,2 l/ha (0,04%)	2	1. brzy z jara 2. před květem

Při opakovaných aplikacích dodržte minimální odstup 14 dnů mezi jednotlivými aplikacemi

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Přípravek je ve smyslu směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES klasifikován jako dráždivý.

Xi dráždivý

Standardní věty označující specifickou rizikovost: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty): S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

První pomoc: Při zasažení očí – rychle a důsledně vypláchněte oba spojivkové vaky proudem čisté vody. Při požití – nikdy nevyvolávejte zvracení. Postiženému podejte 10 tablet živočišného uhlí s 0,5l pitné vody a vyhledejte lékařské ošetření. Při zasažení pokožky – opláchněte dostatečným množstvím

vody, později důkladně omyjte vodou a mýdlem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a po požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

Podmínky skladování: Skladujte při teplotě +5 až +30°C, v dobře větratelných skladech. Skladujte v uzavřených originálních obalech a odděleně od potravin. Chraňte před dětmi. Likvidace zbytků produktu: Případné neupotřebitelné zbytky pomocného rostlinného přípravku rozmíchat ve vodě v poměru min. 1+100 dílů vody a nalít do kompostu.

Likvidace obalů: Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby při skladování v původních obalech.

Přípravek se dodává balený. Objem balení: 1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg (tj. 1 litr • 5 litrů • 10 litrů • 20 litrů)

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže: