

MACORESCO

HNOJIVO ES

TEKUTÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI (ZINKOVÉ) PRO ÚPRAVU ZAKOŘENĚNÍ ROSTLIN

NEBEZPEČÍ



Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Nevdechujte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Okamžitě svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal na schválené úložiště nebezpečných odpadů nebo vraťte prodávajícímu (distributorovi nebo výrobcí).

MACORESCO

Tekuté hnojivo se stopovými živinami (zinkové) pro stimulaci zakořenění rostlin zvýšením kořenové hmoty. Pozitivně ovlivňuje růst a výnosy. Hnojivo obsahuje amonný dusík s vysokou biologickou dostupností pro rostliny. Listové hnojení.

TYP HNOJIVA: E. 1. 7. e

Roztok zinkového hnojiva.

ŽIVINY

Obsah minerálních živin	[% m/m]
Vodorozpuštěný zinek (Zn) (chloridový anion):	8,0 % (m/m)

Používejte pouze při důvodné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávky.

DÁVKY A TERMÍN APLIKACE

Plodina	Termín aplikace	Dávka [l/ha]
ŘEPKA JARNÍ A OZIMÁ	Používá se ve fázi 2. až 6. pravého listu. Na řepku ozimou používat na podzim, na jarní na jaře.	0,8 l/ha
OBILOVINY JARNÍ A OZIMÉ	Používá se na jaře nebo na podzim do konce odnožování.	0,8 l/ha
KUKUŘICE	Používá se ve fázi 2. až 6. pravého listu.	0,8–1,2 l/ha
BRAMBORY	Používá se ve fázi od 2. pravého listu až do fáze tvorby poupát.	0,8–1,2 l/ha
TRÁVA	Používá se od fáze 2. listu do začátku odnožování.	0,8 l/ha
LUŠTĚNINY	Používá se ve fázi dva až osm pravých listů.	0,8 l/ha

JAHODA	Plantáže jahod založené ze šlahounů jahodníku/řízků (počátkem podzimu), použití po zakořenění sazenic do počátku vegetace na jaře, ve fázi 1-3 listy. Plantáže frigo sazenic: po zakořenění sazenic, ve fázi 1-2 listy; v mateřských plantážích (jahodovnách) – pro podporu vývoje kořenů sazenic, ve dvou dávkách každých 7-10 dní.	0,8–1,0 l/ha
MLADÉ SADY, ŠKOLKY OVOCNÝCH STROMŮ	Používejte dvakrát od počátku vegetace. Druhé ošetření se provádí po 7-14 dnech.	0,8–1,0 l/ha
CIBULOVÁ ZELENINA	Používejte ve fázi 3 pravých listů.	0,8–1,2 l/ha
KOŘENOVÁ ZELENINA	Používá se postřikem na listy ve fázi 3 pravých listů.	0,8–1,2 l/ha
SAZENICE ZELENINY	Používá se postřikem na listy ve fázi 3-7 listů, 3-5 dnů před výsadbou.	kropení nebo stříkáním - roztok 0,05–0,1% (0,05–0,1 l w 100 l vody)

Doporučené množství vody: 100-200 l/ha (zemědělské plodiny), 500-1000 l/ha (ovoce) a 400-600 l/ha (plantáže).

Doporučujeme postřik: standardní a jemný

Upozornění: Postup se provádí za klidného počasí, v oblačných dnech, brzy ráno nebo večer.

Zabraňte:

- postřiku kapaliny na sousední plodiny
- překrytí kapaliny na rozhraní ošetřovaných pasů a úvratí.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Výrobek lze použít pro všechny typy postřikovačů. Před přípravou postřikové kapaliny přesně určete její požadované množství. Několikrát protřepejte balení. Odměřené množství nalijte do nádrže postřikovače částečně naplněné vodou (se zapnutým míchadlem) a doplňte vodou do požadovaného množství. V postřikovači, který není vybaven hydraulickým míchadlem, je nutné kapalinu rozmíchat ručně. Vyprázdněný obal je nutné 3 krát opláchnout vodou a následně vodu z oplachování přelit do nádrže postřikovače s postřikovou kapalinou. Připravený roztok použijte okamžitě po jeho přípravě. Aplikujte se zapnutým míchadlem. Po dokončení práce přístroj důkladně omyjte. Vodu použitou k čištění zařízení vystříkejte na již dříve ošetřený povrch.

Výrobek obsahuje vysokou koncentraci živin, a proto během skladování může dojít k mírné krystalizaci, což se projevuje ve formě kalu na dně balení. V tomto případě je nutné pevnou - vykrytalizovanou část přípravku rozpustit v horké vodě (50-60°C) a roztok nalít do nádrže postřikovače.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nejezte, nepijte a nekuřte během používání prostředku.

Nevdechujte páry postřiku.

Vyhýbejte se kontaktu očí a pokožky.

Noste adekvátní ochranný oděv, rukavice a brýle nebo ochranu obličeje.

ZACHÁZENÍ S ODPADY

Přípravek a jeho obal odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Zcela vyprázdněné obaly se po důkladném vypláchnutí spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1 200 – 1 400 °C ve druhém stupni s čištěním plynných zplodin nebo se znehodnotí a předají se prostřednictvím sběrného místa pro zvláštní a nebezpečné odpady do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně. Případně prázdné obaly vraťte prodejci (distributorovi nebo výrobcí).

Vlastní zneškodnění obalů není povoleno.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu v chladné, dobře větrané místnosti v při teplotě od 0 °C až +30 °C.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

LÉKAŘSKÁ POMOC

Po požití: Důkladně si vypláchněte ústa vodou (nepijte mléko, olej ani alkohol). Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte lékaře a ukažte mu etiketu přípravku. **Nebezpečí vdechnutí:** Převedte nebo dopravte poškozeného mimo ošetřovanou oblast, zajistěte mu přístup k čerstvému vzduchu a odpočinek. V případě výskytu znepokojujících příznaků přivolejte lékaře. **Kontaminace kůže:** Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. V případě výskytu podráždění kontaktujte lékaře. **Kontaminace očí:** Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, a současně vyplachujte oči při násilím široce rozevřených víček cca 10 minut čistou tekoucí vodou. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. V případě potřeby kontaktujte oftalmologa. **Příznaky otravy:** bolesti hlavy či závratě, nevolnost, zvracení, podráždění, zarudnutí kůže, alergické reakce, rýma. **Informace týkající se první pomoci pro lékaře.** Nedostatek specifického protiléku. Zahájit symptomatickou podpurnou péčí. V případě otravy orální cestou se doporučuje vypláchnutí žaludku a podání aktivního uhlí.

VÝROBCE

PUH Chemirol Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko

Tel. +48(52) 318 88 00

www.chemirol.com.pl

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

INNVIAGO Agrar CZ s.r.o.

Thamova 137/16

186 00 Praha 8

Tel. + 420 226 205 420

www.cz.innvigo.com

Balení a objem: 1L 5 L 20 L

Datum použitelnosti: 5 let od data výroby.

Č. šarže / datum výroby: na obalu.

Čistá hmotnost balení.